

ข้อมูลคำถาม/คำตอบ เกณฑ์สนเทศ รพ.เขาชัยสน

ว/ด/ป	ผู้ถาม	คำถาม	ประเภทคำถาม	คำตอบ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ตอบ
8/2/2554	ทพ.ไพฑูรย์	ผู้ป่วยเด็กอายุ 3 ปี แพ้ยา amoxycillin สามารถใช้ยาตัวใดแทนได้บ้าง	other	Erythromycin Dry syrup	บัญญัติยา รพ.เขาชัยสน	ภก.พัชรภรณ์
9/2/2554	จนท.รพสต.ลานช้าง	salbutamol ชนิดน้ำสำหรับพ่น เมื่อผสมแล้วจะเก็บได้นานเท่าไร	stability	Salbutamol solution ที่ได้ทำการเจือจางแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง และเก็บไว้ได้นาน 48 ชม.ในตู้เย็นและป้องกันแสง	เอกสารกำกับยา	ภญ.ชนันพิมพ์
16/3/2554	พยาบาลหอผู้ป่วย รพ.เขาชัยสน	ผู้ป่วยอายุ 5 ขวบถูกจระเข้กัด ต้องฉีด PCEC เพื่อป้องกันโรคกลัวน้ำหรือไม่	therapeutic use	วัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดเท่านั้น ดังนั้นผู้ป่วยรายนี้จึงไม่จำเป็นต้องฉีดเนื่องจากจระเข้ไม่จัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา	ภญ.ชนันพิมพ์
1/4/2554	พยาบาลหอผู้ป่วย รพ.เขาชัยสน	ยาHaloperidol injection สามารถให้ IV ได้หรือไม่	Dosage/admin	Haloperidol injection สามารถให้ทาง IV ได้ (intermittent IV)โดยให้ push ช้าๆ มากกว่า 15 นาที	Druginformation Handbook 15th edition	ภญ.วันดี

ว/ด/ป	ผู้ถาม	คำถาม	ประเภทคำถาม	คำตอบ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ตอบ
18/4/2554	พยาบาลหอผู้ป่วย รพ. เขาชัยสน	ceftriazone injection กรณีให้ IV ควร push หรือ drip	Dosage/admin	Ceftriazone injection กรณี IV ควรให้แบบ iv infusion ช้าๆ อย่างน้อย 30 นาที โดยเฉพาะ ขนาดยาที่แพทย์สั่ง 2 gm OD เพื่อลดอาการข้างเคียงเช่น อาเจียน เหนื่อย ออกมาก irritate บริเวณที่ฉีด	Druginformation HB 15 ed.	ภญ.วันดี
20/4/2554	พยาบาล ER รพ.เขาชัยสน	แพทย์สั่ง 10%MgSo4 4 gm push ช้าๆ แต่รพ.เขาชัยสนมี Mgso4 50% จะผสมอย่างไร	Dosage/admin	ต้องใช้ MgSo4 50% 4 amp ผสมกับ 5% D/W 32 ml การคำนวณ ใน 1 amp มีตัวยา 1g (เข้มข้น 10%) มี ยา 10 กรัม ในสลล. 100 ml ถ้าต้องการ ยา 4 กรัม จะใช้ สลล. 40 ml(ยา 4 amp 8ml 5%D/W 32 ml)	-	ภญ.วันดี
22/04/2554	พยาบาลเวช รพ.เขาชัยสน	โรค minigitis ที่เกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรีย มีการป้องกันอย่างไร ใช้ยาอะไร	Therapeutic use/efficacy	ยังไม่มีวิธีการใช้ยาป้องกันโรค minigitis ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	กรมควบคุมโรคระบาด	ภญ.ชนันพิมพ์
6/05/2554	พยาบาลหอผู้ป่วยใน	Clindamycin for animalbite ควรให้ยากี่วัน	Therapeutic use/efficacy	7 วัน	MIMs 2009	ภญ.ชนันพิมพ์
7/06/2554	พยาบาล ER	HepB vaccine ฉีดอย่างไร ในผู้ป่วยไตวาย	Pharmacokinetics	ฉีดเหมือนผู้ป่วยทั่วไปคือ 0-1-2-4 เดือน	MIMs 2009	ภญ.พัชรภรณ์

ว/ด/ป	ผู้ถาม	คำถาม	ประเภทคำถาม	คำตอบ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ตอบ
29/07/2554	นพ.กิตติวุติ	Lincomycin inj ในผู้ใหญ่	Therapeutic use/efficacy	Mild/Moderate infect:600 mg IM daily Severe infect: IM600 mg q 12 hr IV: 600 mg-1 G q 8-12 hr	MIMs2010	ภญ.ชนันพิมพ์
8/09/2554	ภญ.จามรี	Insulin mixtard ที่ไม่ได้เก็บรักษาในตู้เย็นจะมีอายุกี่วัน	Stability	Insulin Mixtard (บ.Novonordisk) ที่ไม่ได้เก็บในตู้เย็นจะมีอายุ 42 วันที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส	เอกสารจากบริษัท novonordisk	ภญ.ชนันพิมพ์
18/10/2554	พยาบาลผู้ป่วยใน	ต้องการ drip furosemide 1000 mg ภายใน 24 ชม. สามารถเจือจางด้วยสารละลายชนิดใดได้บ้างและปริมาณเท่าไร	Compatibility/stability	Furosemide inj สามารถละลายได้ใน D-5-W,NSS ต้องการ drip ภายใน 24 ชม. (furosemide inj ขนาดที่มีในโรงพยาบาลคือ 20mg/2ml) จำนวน 50 Amp ละลายใน D5W จำนวน 1000 ml	คู่มือการเตรียมยาฉีดและความคงตัวของยา หลังผสม กลุ่มงานเภสัชรพ.พัทลุง	ภก.พงษ์ประยูร