

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร

ประเทศไทยจัดกลุ่มยาตามความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ (Pregnancy Category) ตามการแบ่งขององค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. **Category A:** จากการศึกษาการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ไตรมาสแรก พบว่ายามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ (และไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ เมื่อมีการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3)
2. **Category B:** จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่ายามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ แต่ไม่มีการศึกษาการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ หรือจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่ายามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ แต่ไม่พบผลดังกล่าวจากการศึกษาการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ไตรมาสแรก (และไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ เมื่อมีการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3)
3. **Category C:** การศึกษาการใช้ยาในสัตว์ทดลอง พบว่ายามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ แต่ไม่มีการศึกษาการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ หรือไม่มีรายงานการศึกษาการใช้ยาในหญิงมีครรภ์และสัตว์ทดลอง การใช้ยากลุ่มนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงของยาต่อทารกในครรภ์
4. **Category D:** การศึกษาการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ พบว่ามีหลักฐานที่แสดงว่ายามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ แต่อาจมีความจำเป็นต้องใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์ (เช่น ยาที่ใช้ในภาวะช่วยชีวิต-life-threatening หรือยาที่ใช้รักษาโรคที่รุนแรงซึ่งไม่มียาอื่นที่ปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพ)
5. **Category X:** การศึกษาการใช้ยาในสัตว์ทดลองหรือหญิงมีครรภ์ พบว่ายามีทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ หรือมีรายงานจากการใช้ยาในหญิงมีครรภ์ทำให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ยากลุ่มนี้มีความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยา ดังนั้นจึงจัดเป็นยาที่ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ หรือกำลังจะตั้งครรภ์

การเลือกใช้ในสตรีมีครรภ์ นอกจากพิจารณาความปลอดภัยของยาต่อทารกในครรภ์ตาม Pregnancy Category แล้ว อาจต้องคำนึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้

1. ควรเลือกวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยาก่อน ถ้าไม่ได้ผลจึงพิจารณาใช้ยา แต่ควรควบคุมไปกับการรักษาโดยไม่ใช้ยาเพื่อใช้ยาให้น้อยที่สุด
2. เลือกใช้ยาที่มีข้อมูลความปลอดภัยมากที่สุด โดยประเมินระหว่างประโยชน์ของยาที่จะได้รับกับความเสี่ยงของยาต่อทารกในครรภ์
3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือใช้ยาให้น้อยที่สุดในระหว่างการตั้งครรภ์ไตรมาสแรก
4. ใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ให้ผลการรักษา และใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
5. หลีกเลี่ยงการใช้ยาหลายชนิดพร้อมกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ยาสูตรผสม

6. ควรเลือกใช้ยาเก่าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นยาที่ปลอดภัยสูงต่อทารกในครรภ์มากกว่าเลือกใช้ ยาใหม่ซึ่งมีข้อมูลความปลอดภัยน้อยกว่า
7. สตรีในวัยเจริญพันธุ์ที่จะใช้ยาที่มีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ ควรได้รับการประเมินโอกาสในการตั้งครรภ์ก่อนจะใช้ยา

ชนิดของยาและสารที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. **ชนิดที่ไม่ควรใช้ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์** (ตารางที่ 1) เนื่องจากการพิสูจน์เป็นที่ทราบแน่นอนว่ามีคุณสมบัติในการเป็น Teratogen ทำให้เกิดความผิดปกติ หรือความพิการแต่กำเนิด (Teratogenic effect) ในมนุษย์

ตารางที่ 1 แสดงยาหรือสารเคมีที่ไม่ควรใช้ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์

ยา (Drugs)	ความผิดปกติ (Teratogenic effect)
Alcohol	Fetal alcohol syndrome
Angiotensin converting enzyme inhibitors	Sever neonatal renal insufficiency, Decrease skull ossification
Anticholinergic drugs	Neonatal meconium ileus
Androgenic drugs	Masculinization of female fetus
Diethyl stilbestrol	Adenosis of the vagina of young women exposed in uterus
Iodine	Fetal thyroid agenesis (when exposed in early gestation) Goiter, hypothyroidism (when exposed in late gestation)
Isotretinoin	
Lithium	Epstein's anomaly of fetal heart, Fetal goiter, Fetal nephrogenic diabetes insipidus
Misoprostol	Mobius sequence
NSAIDs	Constriction of ductus arteriosus, Necrotizing enterocolitis
Psychoactive drugs (ie. Benzodiazepine, Barbiturate, Opioid)	Neonatal withdrawal symptom
Tetracycline (especially weeks 24-26)	Teeth and bone anomalies
Warfarin	Skeletal defect (chondrodysplasia punctata) Central nervous system defect (mental retardation)

2. **ชนิดที่ไม่ควรใช้ในระยะเวลาไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์** (ตารางที่ 2) เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดอันตราย หรือเกิดความพิการแก่ทารกในครรภ์

ตารางที่ 2 แสดงยาและสารเคมีที่ไม่ควรใช้ในระยะเวลาไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

ยา (Drugs)	ความผิดปกติ (Teratogenic effect)
Antineoplastic, Cytotoxic	Multiple congenital anomalies, Intrauterine growth retardation,

ยา (Drugs)	ความผิดปกติ (Teratogenic effect)
	stillbirth, abortion
Paramethadione	Multiple congenital anomalies
Sex hormone (ie. Androgen, Estrogen)	Increase malformation, Vaginal adenosis, Hypo trophic testis, Epididymal cyst
Thalidomide	Severe deformity of the limb, Blindness, Deafness, Phocomelia, Cleft palate, Malformed internal organs
Trimethadione	Multiple congenital anomalies

3. ชนิดที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในช่วงหลังจากไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ หรือช่วงใกล้คลอด (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงยาและสารที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้หลังจากไตรมาสแรกหรือในช่วงใกล้คลอด

ยา (Drugs)	ความผิดปกติ (Teratogenic effect)
Aminoglycosides	Ototoxicity
Anticonvulsants	
Carbamazepine and Valproic acid	Neural tube defect
Phenytoin	Central nervous system defect, Growth retardation
Antithyroid drugs (PTU and Methimazole)	Neonatal goiter and Hypothyroidism, Aplasia cutis
Chloramphenicol	Gray baby syndrome
Corticosteroids	Central nervous system defect
Hypoglycemic drugs	Neonatal hypoglycemia
Methyldopa	Neonatal meconium ileus, Reduced neonatal blood pressure
Propranolol	Neonatal hypoglycemia, Neonatal respiratory depression, Bradycardia
Reserpine	Nasal congestion, Lethargy
Sulfonamides	Hyperbilirubinemia, Hemolytic anemia (in G-6-PD deficiency), Competition of albumin sites-neonatal kernicterus
Thiazide diuretics	Neonatal thrombocytopenia (rare)

ตารางที่ 4 แสดงยาที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็น Teratogen

Aminopterin/Methotrexate	Diethylstilbestrol	Paramethadione/Trimethadione
Androgens (ie. Danazol)	Ethanol (high dose)	Phenytoin
ACEIs	Etretinate	Polychlorinated biphenyls (PCBs)
Anticonvulsant	Iodides	Tetracycline (esp. weeks 24-26)
Busulfan	Isotretinoin	Thalidomide
Carbamazepine	Lithium	Valproic acid
Cocaine (abuse)	Live vaccines	Vitamin A (>18000 IU/day)
Coumarin derivatives	Methotrexate	
Cyclophosphamide	Methyl mercury (organic)	

หากมารดาให้นมบุตรมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับยาเพื่อรักษาหรือควบคุมอาการของโรค มารดาควรพิจารณาแนวทางการใช้ยาดังต่อไปนี้ เพื่อให้ทารกได้รับยาที่ขับออกทางน้ำนมมารดาให้น้อยที่สุด

1. พิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ยาจริงๆ และสามารถเลื่อนการใช้ยาออกไปได้หลังหย่านมหรือไม่
2. เลือกใช้ยาที่ยอมรับกันว่ามีความปลอดภัยในทารก หรือมีการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ทราบว่ามี toxicity ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก
4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาใหม่ๆ ที่มีข้อมูลน้อย ให้ใช้ยาที่ออกมานานและมีผลการใช้ยาในมารดาที่ให้นมลูกว่าไม่มีอันตราย
5. เลือกใช้ยาที่ผ่านปัสสาวะได้ยาก, มี half-life สั้น, หลีกเลี่ยงการใช้ยาแบบออกฤทธิ์นาน
6. เลือกยาที่มีความสามารถจับกับโปรตีนได้ดี, ละลายในไขมันได้ดี
7. เลือกการให้ยาแบบวันละครั้งเดียว ดีกว่าแบบวันละหลายๆ ครั้ง
8. ถ้าให้ยาแบบวันละครั้ง ควรให้แม่กินยาหลังที่ลูกกินนมแม่และมีการหลับเป็นระยะเวลานาน
9. ถ้าให้แบบหลายครั้งให้ลูกกินนมก่อนแม่กินยาทันที
10. เลือกวิธีการให้ยาที่ทำให้ระดับยาในเลือดแม่ไม่สูง เช่น ใช้แบบทาดีกว่าฉีดหรือกิน
11. ไม่ว่าใช้ยาอะไร ควรเลือกใช้ขนาดต่ำ และใช้เป็นระยะเวลาสั้นที่สุด
12. หลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในช่วงเวลาที่มีความเข้มข้นของยาในน้ำนมสูงสุด โดยอาจให้ทารกดูดนมก่อนใช้ยามื้อถัดไป หรือรอมากกว่า 2-3 ชม. หลังจากรับประทานยาจึงให้นมบุตร อาจให้ยาแก่มารดา ก่อนเวลาที่ลูกจะนอนหลับยาว โดยอาจปับน้ำนมเก็บไว้เพื่อไว้เพื่อให้เสริมระหว่างที่ลูกตื่นขึ้นมากลางดึกหรืออาจให้นมขวดเสริม
13. กรณีที่ทราบแน่ชัดว่ายาที่มารดาได้รับมีผลต่อทารกหรือเป็นยาที่ห้ามใช้ในสตรีให้นมบุตร ควรงดให้นมบุตรและระหว่างนี้ควรปับน้ำนมทิ้งด้วยเพื่อกระตุ้นการหลั่งน้ำนม

ตารางแสดงความปลอดภัยจากการใช้ยาในมารดาที่ให้นมบุตร แบ่งตามกลุ่มยา

1. Anesthetics, Local anesthetics, Preoperative medication

ข้อมูลทั่วไป: ถ้ามารดาจะต้องได้รับการผ่าตัดและดมยาสลบ แนะนำให้ปับน้ำนมเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับให้ลูกกินโดยวิธี cup feeding ในระหว่างการผ่าตัดและในระยะพักฟื้น

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Bupivacaine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Lidocaine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Ephedrine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ แต่ระวังอาการข้างเคียงในทารก งอแง นอนไม่หลับ (irritability and disturbed sleep)
Atropine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ แต่ระวังอาการข้างเคียงในทารก (drying of secretion, temperature elevation and CNS disturbance)
Chloral hydrate	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ แต่ระวังอาการ drowsiness ในทารก
Diazepam	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการใช้ซ้ำๆ ระวังอาการง่วงนอนในทารก ควรเลือกใช้ยา Short-acting benzodiazepine
Morphine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการใช้ซ้ำๆ ระวังอาการข้างเคียงในทารก (apnea and bradycardia)

2. Analgesics, antipyretics, Non-steroidal anti-inflammatory drugs, drugs used to treat gout and disease-modifying agents used in rheumatic disorders.

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Aspirin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ หลีกเลี่ยงการให้เป็นระยะเวลานาน เฝ้าระวังผลข้างเคียงต่อทารก (Hemolysis, prolonged bleeding time and metabolic acidosis)
Ibuprofen	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ผ่านน้ำนมน้อย
Paracetamol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Diclofenac	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ผ่านน้ำนมน้อย
Naproxen	ควรหลีกเลี่ยง ผ่านน้ำนมน้อย แต่ T1/2 ยาว
Tramadol	ผ่านน้ำนมได้บ้าง (น้อย) อาจใช้ระยะสั้นเท่านั้น
Codeine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ เฝ้าระวังอาการข้างเคียง (Apnea and bradycardia, cyanosis)
Morphine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ เฝ้าระวังอาการข้างเคียง (Apnea and bradycardia, cyanosis)
Pethidine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ เฝ้าระวังอาการข้างเคียง (Apnea and bradycardia, cyanosis) พบอาการข้างเคียงได้บ่อยกว่า Morphine
Allopurinol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Colchicine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

3. Antiallergics and drugs used in anaphylaxis.

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Chlorpheniramine	ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้
Dexamethasone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ไม่มีข้อมูลในการใช้ยาวนานๆ
Epinephrine (Adrenaline)	ไม่มีข้อมูล
Hydrocortisone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ไม่มีข้อมูลในการใช้ยาวนานๆ
Prednisolone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

4. Antidotes and Other substances used in poisonings

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Charcoal, activated	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Acetylcysteine	ไม่มีข้อมูล
Calcium gluconate	ไม่มีข้อมูล
Deferoxamine	ไม่มีข้อมูล
Methylene blue	ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้เฝ้าระวังอาการข้างเคียงต่อทารก (hemolysis and jaundice) โดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า 1 เดือน
Naloxone	ไม่มีข้อมูล
Sodium nitrite	ไม่มีข้อมูล
Sodium thiosulfate	ไม่มีข้อมูล

5. Anticonvulsants/Antiepileptics

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Carbamazepine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ฝ้าระว่างผลข้างเคียงในทารก (Jaundice, drowsiness, poor suckling, vomiting and poor weight gain)
Diazepam, Lorazepam	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ ฝ้าระว่างอาการง่วงนอนในทารก (ใช้เป็นครั้งคราว)
Magnesium sulfate	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Phenobarbital	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ให้ฝ้าระว่างผลข้างเคียง (Drowsiness, poor suckling and poor weight gain)
Phenytoin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ให้ฝ้าระว่างผลข้างเคียง (Cyanosis and Mehaemoglobinemia)
Valproic acid	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ให้ฝ้าระว่างผลข้างเคียง (Jaundice)
Clonazepam	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ถ้าให้ในขนาดปกติ

6. Anti-infective, Anthelmintic, Antibacterial, Antituberculosis, Antifungal, Antiviral, Antiprotozoal drugs

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Albendazole	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Mebendazole	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Amoxicillin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Ampicillin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Benzathine penicillin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Cloxacillin, Dicloxacillin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Amoxicillin + Clavulanic acid	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ clavulanic ผ่านน้ำนมได้ แต่ยังมีรายงาน ADR น้อย ควรฝ้าระวังอาการ GI irritate
Ceftazidime	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Ceftriaxone, Cefotaxime	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Chloramphenicol	ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้
Doxycycline	ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ (อาจเกิด staining infant's teeth) อาจใช้ระยะสั้น < 1 week
Erythromycin , Roxithromycin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ (erythromycin ฝ้าระว่าง GI irritate)
Gentamicin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ให้ฝ้าระวัง thrush and diarrhea
Metronidazole	ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ยาผ่านน้ำนมได้ปานกลาง แต่ขนาดยาที่ผ่านน้ำนมต่ำกว่าขนาดยาในเด็ก ถ้ากินในขนาด 2 กรัม ให้งดนมแม่ 12 ชม. โดยให้แม่ปับน้ำนมเก็บไว้ในตู้เย็นก่อน
Nalidixic acid (ต้นแบบ quinolone)	ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ โดยเฉพาะทารกคลอดก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า 1 เดือน ฝ้าระว่างผลข้างเคียง (Hemolysis, jaundice), งดใน G-6-PD deficiency.
Norfloxacin	ข้อมูลไม่ชัดเจน บางเอกสารระบุว่าไม่พบการขับยาทางน้ำนม บางเอกสารให้หลีกเลี่ยง
Ofloxacin	ยาผ่านทางน้ำนมได้บ้าง ต้องสังเกตอาการข้างเคียงต่อทางเดินอาหาร
Ciprofloxacin	ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ จนกว่าจะมีข้อมูล
Nitrofurantoin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ สำหรับทารกที่สุขภาพสมบูรณ์คลอดครบกำหนด หลีกเลี่ยงในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า 1 เดือน ฝ้าระว่างผลข้างเคียง (hemolysis,

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
	jaundice), งดใน G-6-PD deficiency.
Co-trimoxazole	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ สำหรับทารกที่สุขภาพสมบูรณ์คลอดครบกำหนด หลีกเลี่ยงในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า 1 เดือน ฝ้าระว่างผลข้างเคียง (hemolysis, jaundice), งดใน G-6-PD deficiency.
Clindamycin	ให้หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ฝ้าระว่าง ทารกถ่ายเหลว หรือถ่ายเป็นเลือด ลำไส้อักเสบ
Vancomycin	ไม่มีข้อมูล
Dapsone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ หลีกเลี่ยงในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า 1 เดือน ฝ้าระว่างผลข้างเคียง (hemolysis, jaundice), งดใน G-6-PD deficiency.
Isoniazid	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ฝ้าระว่าง jaundice และ toxicity ปลายประสาทอักเสบ
Rifampicin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ฝ้าระว่าง jaundice และ toxicity
Pyrazinamide	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ฝ้าระว่าง jaundice และ toxicity
Ethambutol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ฝ้าระว่าง jaundice และ toxicity
Streptomycin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ฝ้าระว่าง thrush และ diarrhea
Amphotericin B	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Fluconazole	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ผ่านน้ำนมได้ แต่ยังไม่พบรายงาน ADR ในทารก
Griseofulvin	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Acyclovir	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Nevirapine, Zidovudine	อาจเกิดภาวะโลหิตจางชั่วคราว ถ้าใช้ short-term AZT prophylaxis แต่อาการอาจรุนแรงถ้าเป็น long-term AZT prophylaxis
Chloroquine, Primaquine, Quinine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ฝ้าระว่าง hemolysis และ jaundice โดยเฉพาะในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า 1 เดือน, งดใน G-6-PD deficiency.

7. Antimigraine drugs

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Ergotamine	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ต้องระวังผลข้างเคียง (Ergotism)
Propranolol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ระวังผลข้างเคียง (Bradycardia, hypoglycemia and cyanosis)
Flunarizine	ข้อมูลในสัตว์ผ่านน้ำนมได้ แต่ยังไม่พบข้อมูลในมนุษย์

8. Cytotoxic drugs

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Cisplatin	หลีกเลี่ยงการใช้
Cyclophosphamide	หลีกเลี่ยงการใช้
Cytarabine	หลีกเลี่ยงการใช้
Doxorubicin	หลีกเลี่ยงการใช้
etoposide	หลีกเลี่ยงการใช้
Fluorouracil	หลีกเลี่ยงการใช้
Methotrexate	หลีกเลี่ยงการใช้
Vinblastin	หลีกเลี่ยงการใช้
Vincristin	หลีกเลี่ยงการใช้
Tamoxifen	หลีกเลี่ยงการใช้

9. Antiparkinson drugs

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Levodopa + Carbidopa	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ เพราะ levodopa อาจยับยั้งการสร้างน้ำนม

10. Drugs affecting the blood

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Ferrous salt	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Folic acid	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Hydroxocobalamin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Iron dextran	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Heparin sodium	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Enoxaparin	ผู้ผลิตระบุว่า หลีกเลี่ยงการให้นมบุตร ในขณะที่ใช้ยานี้
Phytomenadione (Vitamin K)	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Warfarin	ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ ยาอาจจะผ่านน้ำนมได้
Dextran 70	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Polygeline (Haemaccel)	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

11. Cardiovascular drugs

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Atenolol	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ โดยเฉพาะในทารกทารกก่อนกำหนดหรืออายุน้อยกว่า 1 เดือน เฝ้าระวังผลข้างเคียง (Bradycardia hypotension and cyanosis)
Isosorbide dinitrate	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Verapamil	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Digoxin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Epinephrine (adrenaline)	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Captopril, Enalapril	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Hydralazine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ แต่ไม่มีข้อมูลผลของการใช้ระยะยาว
Hydrochlorothiazide (HCTZ)	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
Methyldopa	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Nifedipine, Amlodipine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ แต่ไม่มีข้อมูลผลของการใช้ระยะยาว
Prozosin	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Dopamine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Aspirin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ถ้าใช้ขนาดต่ำ เฝ้าระวังผลข้างเคียง (Haemolysis, prolonged bleeding time and metabolic acidosis)
Streptokinase	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
rt-PA (Alteplase)	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

12. Diuretics

โดยทั่วไป ยาขับปัสสาวะที่เป็น short-acting thiazide ที่มีขนาดสูง, ขนาดปกติของยาชนิด loop diuretics หรือ long-acting thiazide สามารถยับยั้งการสร้างน้ำนมได้ จึงควรหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Amiloride	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
Furosemide	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
Hydrochlorothiazide (HCTZ)	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
Spironolactone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Mannitol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

13. Tropical Dermatological drugs (รูปแบบยาใช้ภายนอก) ระวัง! ทารกสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังแม่

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Antifungal drugs	
Benzoic acid + Salicylic acid	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Clotrimazole	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Sodium thiosulfate	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Anti-infective drugs	
Gentian violet	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Potassium permanganate	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Silver sulfadiazine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Anti-inflammatory and antipruritic drugs	
Betamethasone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Calamine lotion	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Coal tar	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Podophyllum resin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Salicylic acid	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Urea	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Scabicides and pediculicides	
Benzyl benzoate	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Antiseptics	
Chlorhexidine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Ethanol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Polyvidone iodine	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้เฝ้าระวังอาการข้างเคียงต่อทารก (hypothyroidism)

14. Gastrointestinal drugs Antacids and other antiulcer drugs, Antiemetic drugs, Antispasmodic drugs, Laxatives Drugs use in diarrhea

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Alum milk	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Ranitidine	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ในการใช้ระยะยาว ยาสะสมในน้ำนมได้ อาจปลอดภัย ถ้าให้วันละครั้งก่อนนอน
Omeprazole	หลีกเลี่ยงการใช้ ยาผ่านน้ำนมได้ ยาอาจลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
Domperidone	อาจจะปลอดภัย ทำให้น้ำนมหลังมากขึ้น
Dimenhydrinate	ไม่แนะนำให้ใช้ ยาผ่านน้ำนมได้ ต้องเฝ้าระวังอาการข้างเคียง GI irritability

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Metoclopramide	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ในการใช้ระยะยาว อาจปลอดภัยถ้าใช้ในขนาดต่ำ ทำให้น้ำนมหลังมากขึ้น
Buscopan	ไม่มีข้อมูล
Simethicone	ใช้ได้ ยานี้ถูกดูดซึมในทางเดินอาหารได้น้อย และขับออกทางน้ำนมน้อย
Senna	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Magnesium hydroxide	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Lactulose	ไม่มีข้อมูล
Bisacodyl	ไม่มีข้อมูลว่ายาผ่านทางน้ำนม แต่ไม่แนะนำให้ใช้
Oral rehydration salts	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

15. Steroid, Hormones and contraceptives

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Dexamethasone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ไม่มีข้อมูลในการให้ระยะยาว
Prednisolone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ผ่านน้ำมน้อย แต่งดให้นมบุตร 4 ชม.หลังกินยา
Ethinylestradiol + Levonorgestrel	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
Ethinylestradiol + Norethisterone	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
Levonorgestrel	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ตั้งแต่ 6 สัปดาห์หลังคลอด
Medroxyprogesterone acetate	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ตั้งแต่ 6 สัปดาห์หลังคลอด
Ethinylestradiol	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เพราะจะไปยับยั้งการสร้างน้ำนม
Norethisterone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Medroxyprogesterone acetate	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ตั้งแต่ 6 สัปดาห์หลังคลอด
Thyroid and antithyroid drugs (ติดตาม thyroid function ของลูก)	
Levothyroxine (L-thyroxine)	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Propylthiouracil (PTU)	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ผ่านน้ำมน้อย
Methimazole	ควรเลือก PTU ก่อน แม้ยานี้จะผ่านน้ำมน้อยแต่ก็มี T ½ ยาว ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ขนาดต่ำ 10-15 mg/วัน

16. Insulins and other anti-diabetic agents

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Glibenclamide	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ แต่เฝ้าระวัง! hypoglycemiaใน ลูก
Insulin injection	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ อาจต้องลดขนาดลง
Intermediate-acting insulin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ อาจต้องลดขนาดลง
Metformin	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ แต่บางเอกสารระบุว่าปลอดภัย ผ่านน้ำมน้อย (%RID < 0.3)

17. Immunologicals

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Antitetanus immunoglobulin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Antivenum sera	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Diphtheria antitoxin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Immunoglobulin (human)	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Rabies immunoglobulin	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
BCG vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Diphtheria vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Hepatitis B vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Measles vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Pertussis vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Poliomyelitis vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Tetanus vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Influenza vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Meningococcal meningitis	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Mumps vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Rabies vaccine (inactivated)	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Rubella vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Typhoid vaccine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

18. Muscle relaxants (peripherally acting) and Cholinesterase inhibitors

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Neostigmine	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ หากใช้ร่วมกับ atropine
Pyridostigmine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Vecuronium	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

19. Ophthalmological preparations

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Gentamicin	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ หากใช้ร่วมกับ atropine
Silver nitrate	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Tetracycline	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Prednisolone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Tetracaine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Acetazolamide	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Pilocarpine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Timolol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Atropine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Epinephrine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

20. Oxytocics and Antioxytocics

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Ergometrine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการให้ยาซ้ำๆ อาจยับยั้งการสร้างน้ำนม
Oxytocin	ปลอดภัยถ้าใช้ในระยะสั้น ในระยะยาวควรหลีกเลี่ยง
Salbutamol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

21. Psychotherapeutic drugs, Drugs use in mood disorders

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Chlorpromazine	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ เฝาระวัง Drowsiness ในลูก
Fluphenazine	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ เฝาระวัง Drowsiness ในลูก
Haloperidol	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้ เฝาระวัง Drowsiness ในลูก
Fluoxetine	ผ่านน้ำนมได้บ้าง สามารถใช้ได้โดยต้องเฝาระวัง อาการข้างเคียงอย่างใกล้ชิด เช่น colic irritability (กระสับกระส่าย งอแง), ชัก เป็นต้น ห้ามใช้กรณีทารกคลอดก่อนกำหนด หรือในช่วงแรกคลอด ห้ามใช้ในขนาดสูง
Amitriptyline	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ในขนาดไม่เกิน 150mg/day
Carbamazepine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ เฝาระวังผลข้างเคียง (Jaundice, drowsiness, poor suckling, vomiting and poor weight gain)
Lithium carbonate	หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้
Valproic acid	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ เฝาระวังผลข้างเคียง (jaundice)
Diazepam	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ถ้าให้ครั้งเดียว หลีกเลี่ยงการให้ซ้ำๆ เฝาระวัง drowsiness ควรใช้ยาที่มีฤทธิ์สั้นเช่น lorazepam แทน

22. Drugs acting on the respiratory tract.

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Antiasthmatic drugs	
Aminophylline	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Beclometasone	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Ipratropium bromide	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Salbutamol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Theophylline	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Antitussive	
Dextromethorphan	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
M.tussis	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ (ระวัง! มี alcohol ผสม)
Ammonium carbonate	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ (ระวัง! มี alcohol ผสม)
Bromhexine	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
Acetylcysteine (Fluimucil)	ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

23. Solution correcting water, Electrolyte and acid-base disturbances

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Oral rehydration salt	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Potassium chloride	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Glucose	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Sodium chloride	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Water for injection	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

24. Vitamin and Minerals

ยา (Drugs)	ความปลอดภัย (Safety)
Ascorbic acid	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ในขนาดปกติที่แนะนำ ถ้าขนาดมากกว่านั้นให้เฝ้าระวังอาการข้างเคียงต่อทารก (hemolysis and jaundice) โดยเฉพาะทารกที่คลอดก่อนกำหนด
Ergocalciferol	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ในขนาดปกติที่แนะนำ
Iodine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ในขนาดปกติที่แนะนำ ในกรณีใช้รักษาภาวะขาดไอโอดีนในมารดา ให้เฝ้าระวังอาการข้างเคียงต่อทารก (hypothyroidism)
Pyridoxine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้
Thiamine	ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

ตารางแสดงข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
ACARBOSE	Oral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
ACETAZOLAMIDE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	
ACETYLCYSTEINE	Oral Parenteral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
ACTIVATED CHARCOAL	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Use with caution <Drug information>	
ACYCLOVIR	Oral Parenteral Topical	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	
ADENOSINE	Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	- เนื่องจาก half life ของยาที่สูง โอกาสที่ยาจะผ่านเข้าน้ำนมจึงมีน้อยมาก
ALBENDAZOLE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
ALENDRONIC ACID	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
ALBUMIN	Parenteral	C	- Compatible <Drug information>	
ALFACALCIDOL	Oral	C	- Not recommended <Drug information>	
ALFUZOSIN	Oral	B	N/A	
ALLOPURINOL	Oral	C	- Compatible <AAP>	
ALPRAZOLAM	Oral	D	- Enters breast milk/Not recommended <Drug information>	- มีรายงานการใช้ยากลุ่ม BZP อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และอาจทำ

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			information>	ให้เกิดอาการ withdrawal ในทารกแรกคลอด (tremors, irritability, hyperactivity, tachypnea)
ALTEPLASE	Parenteral	C	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
ALUMINA & MAGNESIA SUSP. (ANTACID)	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO>	- แนะนำให้ใช้ Antacid ในระหว่างตั้งครรภ์ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ขนาดสูงๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ - ยาขับออกทางน้ำนมได้ แต่ไม่พบรายงานความเป็นพิษต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Antacid ได้
ALUMINIUM HYDROXIDE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO>	
AMIKACIN	Parenteral	D	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <Drug in pregnancy & lactation>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานผลของยาในกลุ่ม aminoglycosides ทำให้เกิดความผิดปกติต่อการได้ยิน และอาการหูหนวกของทารก
AMILORIDE + HCTZ	Oral	B	- Avoid breast-feeding <WHO>	
AMINOPHYLLINE	Oral Parenteral	C	- Compatible <AAP>	- ยาขับออกทางน้ำนมได้ อย่างไรก็ตามสามารถให้นมบุตรขณะใช้ยาได้ แต่มีรายงานว่าอาจทำให้ทารกเกิด Irritability (ไม่โง่งาย, โวยต่อการกระตุ้น) หากพบอาการดังกล่าวในทารก ควรหยุดให้นมบุตร
AMIODARONE	Oral Parenteral	D	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/contraindicated <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติของทารก (thyroid abnormalities, ventricular septal defect, systolic murmur)
AMITRIPTYLINE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding in doses up to 150 mg/day <WHO> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Amitriptyline ในขนาดการใช้ไม่เกินวันละ 150 mg ได้ อย่างไรก็ตาม ควรเฝ้าระวังอาการอื่นไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในทารก เช่น อาการง่วงซึม เป็นต้น
AMLODIPINE	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
AMLODIPINE + VALSARTAN	Oral	C ^{1st} D ^{2nd} D ^{3rd}	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	- หยุดการให้นมบุตร ระหว่างใช้ยา หรือ ให้หยุดยา ก่อนให้นมบุตร
AMMONIUM CARBONATE MIXT.	Oral	N/A	N/A	
AMOXICILLIN	Oral	B	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- ยาอาจมีผลกระทบต่อ normal flora ในลำไส้ และอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาการ แพ้ในทารกได้ จึงควรเฝ้าระวังอาการอื่น ไม่พึงประสงค์ เช่น ผื่นแพ้ยา หากพบให้ หยุดให้นมบุตร และห้ามใช้ยากลุ่มนี้ใน เด็ก
AMOXICILLIN + CLAVURONIC	Oral Parenteral	B	- Compatible with breast- feeding <WHO> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- ยาอาจมีผลกระทบต่อ normal flora ในลำไส้ และอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาการ แพ้ในทารกได้ จึงควรเฝ้าระวังอาการอื่น ไม่พึงประสงค์ เช่น ผื่นแพ้ยา หากพบให้ หยุดให้นมบุตร และห้ามใช้ยากลุ่มนี้ใน เด็ก
AMPHOTERICIN B	Parenteral	B	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
AMPICILLIN	Parenteral	B	- Compatible with breast- feeding <WHO> - Compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
AMPICILLIN + SULBACTAM	Parenteral	B	- Compatible Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
ANASTROZOLE	Oral	X	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	- ยาอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ายาผ่านรก และยาามีผลทำให้ delay fetal development
ARIPIRAZOLE	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
ASPIRIN	Oral	C/D	- Compatible with breast- feeding but to avoid long-term	- Cat. C in low doses (<150 mg/day), Cat. D only if full

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			therapy <WHO>	dose - ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Aspirin ในขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะการใช้ในขนาดสูงหรือการใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพราะยา มีผลทำให้เกิดภาวะทารกในครรภ์, ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบเลือดในมารดาและทารก และเพิ่มอัตรา การตายของทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะห้ามใช้ในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ เพราะจะทำให้คลอดช้า และเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกและมารดาได้
ATENOLOL	Oral	D	- Avoid breast-feeding <WHO> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานการใช้ยาใน 1 st & 2 nd trimesters แล้วทำให้ทารกในครรภ์โตช้า และทารกแรกคลอด น้ำหนักน้อย - การใช้ยาใน parturition อาจทำให้เกิดความผิดปกติของทารกแรกคลอด (bradycardia, hypoglycemia)
ATORVASTATIN	Oral	X	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	- มีรายงานผลของยาในกลุ่ม statin ทำให้เกิดการตายและความพิการของทารกในครรภ์และทารกแรกคลอด
ATROPINE	Parenteral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้ ฝ้าระวังอาการข้างเคียงในทารก (drying of secretion, temperature elevation and CNS disturbance)
AZITHROMYCIN	Oral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
BACLOFEN	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
BENZTROPINE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
BETAHISTINE MESILATE	Oral	N/A	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	- สามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้ ถ้าเห็นว่าจำเป็นและมีประโยชน์มากกว่าโทษ

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			information>	
BIMATOPROST	Ophth	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
BISACODYL	Oral Rectal	B	N/A	- ไม่ได้เป็นทางเลือกแรกของยาระบายที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และหากใช้ในระยยาว ควรหลีกเลี่ยง
BRIMONIDINE	Ophth	B	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
BROMHEXINE	Oral	N/A	N/A	- หากจำเป็นต้องใช้ยา ควรดให้นมบุตร
BROMOCRIPTINE	Oral	B	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation>	
BUDESONIDE	Inhalation Nasal	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- การใช้ corticosteroid ชนิดสูดพ่น ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการให้นมบุตร (NAEPP, 2005)
BUDESONIDE + FORMOTEROL	Inhalation	C	- Not recommended <Product information>	- เนื่องจากไม่มีข้อมูลของยา Formoterol ในหญิงให้นมบุตร จึงไม่ แนะนำให้ใช้
BUPIVACAINE	Parenteral	C	- Compatible with breast- feeding <WHO> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
CALCIPOTRIOL	Topical	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
CALCITRIOL	Oral	C	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
CAL. POLYSTYRENE SULFONATE	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
CALCIUM ACETATE	Oral	C	- Excretion in breast milk <Drug information>	
CALCIUM CARBONATE	Oral	C	- Excretion in breast milk <Drug information>	
CALCIUM GLUCONATE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
CARBACHOL	Ophth	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
CARBAMAZEPINE	Oral	D	- Compatible with breast-feeding. Monitor infant for side effects. <WHO> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และรายงานการใช้ยาใน 1 st trimesters ทำให้เกิดความพิการของทารกแรกคลอด (เสี่ยงต่อการเกิด neural-tube defects, cardiovascular defects, และ urinary tract defects)
CARBOCYSTEINE	Oral	N/A	N/A	- ไม่แนะนำใน 1 st trimesters - ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในหญิงให้นมบุตร หากจำเป็นต้องใช้ ควรงดให้นมบุตร
CARMINATIVE MIXT	Oral	N/A	N/A	
CARVEDILOL	Oral	C ^{1st} D ^{2nd} D ^{3rd}	- Compatible <AAP> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	- หากจำเป็นต้องใช้ ควรงดให้นมบุตร หรือหยุดยาระหว่างให้นมบุตร
CEFACLOL	Oral	B	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
CEPHALEXIN	Oral	B	- Enters breast milk/use caution <Drug information>	
CEFAZOLIN	Parenteral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	
CEFDINIR	Oral	B	- Compatible <AAP>	
CEFEPIME	Parenteral	B	- Compatible <AAP>	
CEFIXIME	Oral	B	- Compatible <AAP>	
CEFOPERAZOLE + SULBACTAM	Parenteral	B	- Compatible <AAP>	- ยาอาจรบกวน normal flora ในทางเดินอาหารของเด็ก
CEFOTAXIME	Parenteral	B	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
CEFOXITIN	Parenteral	B	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
CEFPIROME	Parenteral	C	- Excreted in breast milk; unsure if safe; do not use <Medscape>	
CEFTAZIDIME	Parenteral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
CEFTRIAXONE	Parenteral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
CELECOXIB	Oral	C	- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
CEPHALEXIN	Oral	B	- Enters breast milk/use caution <Drug information>	
CETIRIZINE	Oral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
CHLORAL HYDRATE	Oral	C	- Compatible <AAP>	- ฝ้าระวังอาการ drowsiness ในทารก
CHLORAMPHENICAL	Ophth Otic Parenteral	C	- Avoid breast-feeding <WHO> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- ทำให้เกิดผลข้างเคียง drowsiness และ irritability
CHLOROQUIN	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ฝ้าระวัง hemolysis และ jaundice โดยเฉพาะในทารกทารกก่อนกำหนด หรืออายุน้อยกว่า 1 เดือน - งดใน G-6-PD deficiency.
CHLORPHENIRAMINE	Oral Parenteral	B	- Avoid breast-feeding <WHO>	- ทำให้เกิดผลข้างเคียง drowsiness และ irritability
CHLORPROMAZINE	Oral Parenteral	C	- Avoid breast-feeding <WHO> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ทำให้เกิดผลข้างเคียง drowsiness และ irritability
CHONDROITIN + HYALURONIC ACID	Ophth	N/A	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
CILOSTAZOL	Oral	C	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
CIPROFLOXACIN	Parenteral	C	- Compatible <AAP>	- มีผล arthropathy ต่อตัวอ่อนของ

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	สัตว์
CISATRACURIUM	Parenteral	B	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
CLARITHROMYCIN	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
CLINDAMYCIN	Oral Parenteral	B	- Avoid breast-feeding if possible. Monitor infant for side effects. <WHO> - Compatible <AAP>	- ฝ้าระวัง ทารกถ่ายเหลว หรือถ่ายเป็นเลือด ลำไส้อักเสบ
CLOBETASOL	Topical	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
CLONAZEPAM	Oral	D	- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ และอาจทำให้เกิดอาการ withdrawal ในทารกแรกคลอด (tremors, irritability, tachypnea hyperactivity)
CLOPIDOGREL	Oral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
CLORAZEPATE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding. Monitor infant for side effects. <WHO> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
CLOTRIMAZOLE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO>	
	Topical Vaginal	B		
CLOXACILLIN	Oral Parenteral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
CLOZAPINE	Oral	B	- Enters breast milk/not	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			recommended <Drug information>	
CODEINE	Oral	C/D	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	- Cat. D ถ้าใช้ในขนาดสูงหรือใช้เป็นระยะเวลานาน
COLCHICINE	Oral	D	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	- มีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (hepatitis, cirrhosis, nephrotic syndrome, down syndrome)
COLISTIMETHATE SODIUM	Parenteral	C	- Excreted in breast milk/use caution <Drug information>	
CONJUGATED ESTROGEN	Oral Parenteral Topical	X	- Avoid breast-feeding <WHO> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- มีรายงานการศึกษาของการใช้ยาในกลุ่มนี้ทำให้เกิดความผิดปกติได้ในทารก - จะลดคุณภาพ และปริมาณของน้ำนมลง
CO-TRIMOXAZOL	Oral Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding. Monitor infant for side effects. <WHO> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
CYCLOPHOSPHAMIDE	Parenteral	D	- Avoid breast-feeding <WHO> - Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ว่าทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (urogenital sinus formation, fetal masculinization, congenital adrenal hyperplasia) - มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
CYCLOSERINE	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
DANAZOL	Oral	X	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enter breast milk/contraindicated <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ว่าทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (urogenital sinus formation, fetal masculinization, congenital adrenal hyperplasia)
DAPSONE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
DEFERASIROX	Oral	C	N/A	- ในหญิงให้นมบุตร ควรใช้เมื่อมีประโยชน์มากกว่าโทษ งดให้นมบุตรระหว่างบริหารยา หรือหยุดยาก่อนให้นมบุตร
DEFERIPRONE	Oral	D	N/A	- ในหญิงให้นมบุตร ควรใช้เมื่อมีประโยชน์มากกว่าโทษ งดให้นมบุตรระหว่างบริหารยา หรือหยุดยาก่อนให้นมบุตร
DESFEROXAMINE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
DESFLURANE	Nasal	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
DESMOPRESSIN	Nasal	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
DEXAMETHASONE	Ophth	N/A	- Compatible with breast-feeding <WHO>	
	Parenteral	C D ^{1st}	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
DEXTRAN 40	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
DEXTROMETHOPHAN	Oral	C	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
DIAZEPAM	Oral Parenteral	D	- Compatible with breast-feeding. Monitor infant for side effects. <WHO> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติของทารกแรกคลอด (e.g. facial dimorphism, growth retardation, inguinal hernia, pyloric stenosis, cardiac defects, central nervous system defects) นอกจากนี้อาจทำให้เกิดอาการ withdrawal ในทารกแรกคลอด (tremors, irritability, hyperactivity, tachypnea)

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
DICLOFENAC	Oral Parenteral Topical	C	- Compatible <AAP> - Excrete in breast milk/not recommended <Drug information>	
DICLOXACILLIN	Oral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
DDI (DIDANOSINE)	Oral	B	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
DIGOXIN	Oral Parenteral	C C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
DIMENHYDRINATE	Oral Parenteral	B B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
DINOPROSTONE	Vaginal	C	N/A	
DIOSMIN + HESPERIDIN	Oral	N/A	- Excretion into milk/should avoid <Product information>	- สามารถใช้ในสตรีมีครรภ์ได้ (Micromedex)
DIPHTHERIA-TETANUS VACCINE	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <CDC, FDA> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
DIPHTHERIA-TETANUS- PERTUSSIS VACC.	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <CDC, FDA> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
DIPOTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Product information>	
DOBUTAMINE INJ	Parenteral	B	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
DOMPERIDONE	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
DOPAMINE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
DOXAZOSIN	Oral	C	- Enters breast milk/use caution <Drug information>	
DOXORUBICIN	Parenteral	D	- Avoid breast-feeding <WHO> - Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation>	- การใช้ใน 1 st trimester จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด congenital malformations และการใช้ใน 2 nd & 3 rd trimester จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด growth retardation - มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก และ เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
DOXYCYCLINE	Oral	D	- Avoid breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (Yellow-gray brown tooth discoloration, inhibition of born growth, skeletal abnormalities) - หยุดการเจริญเติบโตของกระดูก และ ทำให้ฟันเป็นด่าง
EFAVIRENZ	Oral	D	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	- มีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติในทารกโดยเฉพาะใน 1 st trimester (neural tube defects, congenital hydrocephalus)
ENALAPRIL	Oral	C ^{1st} D ^{2nd} D ^{3rd}	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (neonatal injury or death, hypotension, neonatal anemia, hyperkalemia, neonatal skull hypoplasia, anuria, and renal failure, limb contractures, craniofacial deformities, hypoplastic lung development)
ENOXAPARIN	Parenteral	B	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
EPERISONE	Oral	N/A	- Excretion in breast milk unknown/should avoid <Product information >	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
EPHEDRINE	Oral Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO>	
EPINEPHRINE	Oral Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
EPIRUBICIN	Parenteral	D	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติในทารก โดยทำให้เกิด embryotoxic และ fetotoxic
ERGOTAMINE + CAFFEINE	Oral	X	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation>	- ยาผ่านรกได้ และมีผลทำให้มดลูกบีบตัวและลดปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงตัวอ่อน - มีรายงานผลของยาทำให้เกิดการตายของทารกในครรภ์และความพิการของทารก
ERTAPENEM	Parenteral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
ERYTHROMYCIN	Oral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
ERYTHROPOIETIN	Parenteral	C	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
ESOMEPRAZOLE	Oral	B	- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
ESTRADIOL	Topical	X	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- มีรายงานการศึกษาของการใช้ยาในกลุ่มนี้ว่าทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (cardiovascular defect, hypospadias)
ESTRADIOL + DESOGESTREL	Oral	X	- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- มีรายงานของการใช้ยาในกลุ่มนี้ว่าทำให้เกิดความผิดปกติได้ในทารก (congenital heart defects, CNS defects, limb reduction malformations, general malformations and modified development of sexual organ)

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
ESTRADIOL + LEVONORGESTREL	Oral	X	N/A	ข้อมูลเหมือนกับ ESTRADIOL + DESONORGESTREL
ESTRADIOL + NORGESTREL	Oral	X	- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	ข้อมูลเหมือนกับ ESTRADIOL + DESONORGESTREL
ETHAMBUTAL	Oral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
ETHIONAMIDE	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
ETOMIDATE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
ETONOGESTREL IMPLANT	Implant	X	- Enters breast milk/use caution <Drug information>	
ETORICOXIB	Oral	N/A	- Excretion in breast milk unknown/should avoid <Drug.com>	
EZETIMIBE	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
FENOFIBRATE	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
FENTANYL	Parenteral	C/D	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- กรณีใช้ในระยะเวลาหรือขนาดยาที่สูงจะเป็น Cat. D - Drug information ยอมรับให้ใช้ในหญิงให้นมบุตรแบบ single dose ได้
FERROUS FUMARATE	Oral	N/A	N/A	
FERROUS SULFATE	Oral	N/A	N/A	
FEXOFENADINE	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
FILGRASTIM	Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
FINASTERIDE	Oral	X	- Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (hypospadias)
FLUCONAZOLE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
FLUNARIZINE	Oral	N/A	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
FLUOROMETHOLONE	Ophth	C	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
FLUOROURACIL	Parenteral	D	- Avoid breast-feeding <WHO> - Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	- มีรายงานการศึกษาทั้งในคนและสัตว์ว่าทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (cleft lip, ventricular septal defect, congenital malformations)
FLUOXETINE	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
FLUPENTIXOL DEPOT	Parenteral	C	- Enters breast milk/use caution <Drug information>	
FLUPHENAZINE	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding. Monitor infant for side effects. <WHO>	
FLUTICASONE	Nasal Inhalation	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
FLUTICASONE + SALMETEROL	Inhalation	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
FOLIC ACID	Oral	A/C	- Compatible with breast-feeding <WHO>	C if dose > US RDA
FONDAPARINUX	Parenteral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
FOSFOMYCIN	Parenteral	B	- Probably compatible <Drug	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			in pregnancy & lactation> - Excretion into breast milk/not recommended <Drug information>	
FUROSEMIDE	Oral Parenteral	C	- Avoid breast-feeding <WHO> - Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enter breast milk/use caution <Drug information>	
GABAPENTIN	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
GALANTAMINE	Oral	B	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
GEMFIBROZIL	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
GENTAMICIN	Ophth Parenteral	C D	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enter breast milk/use caution <Drug information>	- ยานี้ผ่านรกได้ และมีรายงานผลของยาในกลุ่ม aminoglycosides ทำให้เกิดความผิดปกติต่อการได้ยิน และอาการหูหนวกของทารก
GLIBENCLAMIDE	Oral	B/C	- Not recommended <Drug information>	
GLIPIZIDE	Oral	C	- Not recommended <Drug information>	
GLUCOSAMINE	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
GLYCERYL TRINITRATE	Lingual Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
GLYCERYL GUAIACOLATE	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
GRAMICIDIN + NEOMYCIN + POLYMYXIN B	Ophth	C	- Use caution <Product information>	
GRISEOFULVIN	Oral	X	- Excretion in breast milk unknown/not recommended	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			<Drug information>	
HALOPERIDOL	Oral Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding. Monitor infant for side effects. <WHO> - Enter breast milk/not recommended <Drug information>	
HCTZ	Oral	B	- Avoid breast-feeding <WHO> - Enter breast milk/not recommended <Drug information>	
HCTZ + LOSARTAN	Oral	C/D	N/A	- 2 nd & 3 rd trimesters เป็น Cat. D - ในหญิงให้นมบุตร ควรใช้เมื่อมีประโยชน์มากกว่าโทษ งดให้นมบุตรระหว่างบริหารยา หรือหยุดยาก่อนให้นมบุตร
HEPARIN	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	
HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	- Use of HBIG is not contraindicated in breast-feeding woman (CDC, 2001).
HEPATITIS B VACCINE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	- Maternal vaccination is not a contraindication to breast-feeding (CDC, 2013).
HYALURONATE SODIUM	Parenteral	N/A	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
HYDRALAZINE	Oral Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
HYDROCORTISONE	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- ยาม่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (congenital malformations, cerebral palsy, polycystic kidney disease, cleft palate, cataracts)
HYDROXYPROGESTERONE	Parenteral	D	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	- มีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (spina bifida, cataract, anencephalus, hydrocephalus,

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
				tetralogy of fallot, common truncus arteriosus, ventricular septal defect)
HYDROXYZINE	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
HYOSCINE	Oral Parenteral	C C	- Compatible <AAP> - Enter breast milk/use caution <Drug information>	
IBUPROFEN	Oral	C/D	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- กรณีอายุครรภ์มากกว่า 30 สัปดาห์ จะเป็น Cat. D - ยาผ่านรกได้ และมีรายงานการใช้ยา NSAIDs ทำให้เกิด premature closure of ductus arteriosus และ delay onset of labor
IMIPINEM + CILASTATIN	Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
IMIPRAMINE	Oral	C	- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
INDINAVIR	Oral	C	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
INSULIN ASPART + INSULIN PROTAMINE	Parenteral	B	- Safe to use while breast-feeding <Medscape>	
INSULIN DETEMIR	Parenteral	B	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information> - Safe to use while breast-feeding <Medscape>	
INSULIN GLARGINE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information> - Safe to use while breast-feeding <Medscape>	
INSULIN SOLUBLE	Parenteral	B	- Compatible <Drug in	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			pregnancy & lactation>	
INSULIN SOLUBLE + INSULIN ISOPHANE	Parenteral	B	- Safe to use while breast-feeding <Medscape>	
IOHEXOL	Parenteral	B	- Compatible <AAP> - Enter breast milk/use caution <Drug information>	
IOPROMIDE	Parenteral	B	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
IOVERSOL	Parenteral	B	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
IPRATROPIUM + FENOTEROL	Inhalation	N/A	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
IRBESATAN	Oral	D	- Compatible <AAP> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
IRON SUCROSE COMPLEX	Parenteral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown / use caution <Drug information>	
ISOFURANE	Inhalation	C	- Compatible <AAP> Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
ISONIAZID	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enter breast milk/compatible <Drug information>	
ISOPHAN PROTAMINE INSULIN (NPH)	Parenteral	B	- Safe to use while breast-feeding <Medscape>	
ISOSORBIDE DINITRATE	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
ISOSORBIDE MONONITRATE	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
ISPAGHULA HUSK	Oral	N/A	N/A	- ตัวยาไม่ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด จึงปลอดภัยสำหรับการใช้ในหญิงตั้งครรภ์
ITRACONAZOLE	Oral	C	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
JAPANESE ENCEPHALITIS VACCINE	Parenteral	B	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
KANAMYCIN	Parenteral	D	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติต่อการได้ยิน และอาการหูหนวกของทารก
KAOLIN + PECTIN	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
KETAMINE	Parenteral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	- เนื่องจาก ketamine มีค่าครึ่งชีวิตที่ 2.17 ชม. และระดับยาในเลือดจะลดลงจนไม่สามารถตรวจสอบได้ที่เวลา 11 ชม.หลังให้ยา ดังนั้นหลังเวลาดังกล่าวสามารถให้นมบุตรได้
KETOCONAZOLE	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
KIDMIN SOLUTION	Parenteral	N/A	N/A	- kidmin เป็น Total amino acid 7.2% w/v
LACTULOSE	Oral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
LAMIVUDINE	Oral	C	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/contraindicated <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
LAMIVUDINE + STAVUDINE	Oral	C	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
LAMIVUDINE +STAVUDINE+ NEVIRAPINE	Oral	C	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE	Oral	C	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enter breast milk/contraindicated <Drug information>	
LAMIVUDINE + NEVIRAPINE + ZIDOVUDINE	Oral	C	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
LAMOTRIGINE	Oral	C	- Enter breast milk/use caution <Drug information>	
LANSOPRAZOLE	Parenteral	B	Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
LETROZOLE	Oral	X	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	- มีรายงานการศึกษาในสัตว์ว่าทำให้เกิด embryo toxic, fetotoxic และ teratogenic
LEUCOVORIN	Parenteral	C	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
LEUPRORELIN	Parenteral	X	- Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
LEVODOPAR + BENSERAZIDE	Oral	N/A	N/A	- ไม่แนะนำให้ใช้ทั้งในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
LEVOFLOXACIN	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
LEVOTHYROXINE	Oral	A	- Compatible <AAP> - Enters breast milk / use caution <Drug information>	
LIDOCAINE	Parenteral Topical	B B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
LIDOCAINE + ADRENALINE	Parenteral	B	- Lidocaine enters breast milk/use caution <Drug information>	
LINCOMYCIN	Parenteral	C	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enter breast milk / not recommended <Drug information>	
LITHIUM CARBONATE	Oral	D	- Avoid breast-feeding <WHO> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติต่อระบบต่างๆ ของทารก (e.g. cardiovascular, CNS, neuromuscular) - อาจทำให้เกิด cyanosis ,floppiness ,heart murmur, lethargy, hypothermia
LOPERAMIDE	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
LOPINAVIR + RITONAVIR	Oral	C	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
LORATADINE	Oral	B	- Compatible <AAP>	
LORAZEPAM	Oral	D	- Enter breast milk/not recommended <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานการใช้ยาในกลุ่ม BZP อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
LOSARTAN	Oral	C/D	- Compatible <AAP> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	- Cat. D in 2 nd & 3 rd trimesters - มีรายงานผลของยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อ rennin angiotensin system ทำให้เกิดการตายและความผิดปกติของทารกในครรภ์และทารกแรกคลอด (Hypotension, neonatal anemia,

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
				hyperkalemia, neonatal skull hypoplasia, anuria, and renal failure)
M.M.R. VACCINE	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
MAGNESIUM HYDROXIDE	Oral	A	Safe for nursing <Medscape>	
MAGNESIUM SULFATE	Parenteral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
MANIDIPINE	Oral	N/A	N/A	- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และระงับการใช้ในหญิงให้นมบุตร
MANNITOL INJ	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
MEASLE VACCINE	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
MEBENDAZOLE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
MEDROXY PROGESTERONE	Oral Parenteral	X	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	- มีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติของทารก (congenital heart defects)
MEFENAMIC	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
MELOXICAM	Oral	C/D	- Compatible <AAP> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
MEPIVACAINE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
MEROPENEM	Parenteral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk/use caution <Drug information>	
METFORMIN	Oral	B	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
METHADONE	Oral	C	- Compatible <AAP>	- ไม่พบอาการข้างเคียงในเด็กที่มารดาบริหารยา methadone ในขนาดไม่เกิน 20 mg/24 hrs (AAP)
METHIMAZOLE	Oral	D	- Compatible <AAP>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติของทารก (fetal goiter, hypothyroidism, analatresia, aplasia cutis scalp defects and developmental delay) - The American Thyroid Association ยอมรับการใช้ยาในขนาดไม่เกิน 30 mg/day ว่าปลอดภัยในการให้นมบุตร
METHOTREXATE INJ	Oral Parenteral	X X	- Avoid breast-feeding <WHO> - Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/contraindicated <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานการศึกษาว่า ทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (ear malformation, toe malformations, cleft palate, ocular hypertelorism, hydrocephalus, craniosynostosis) - กดไขกระดูกในเด็ก
METHYLDOPA	Oral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enter breast milk/use caution <Drug information>	
METHYLERGOMETRINE	Parenteral	C	Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
METHYLPHENIDATE	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enter breast milk / use	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			caution <Drug information>	
METHYLPREDNISOLONE	Parenteral	C	- Enter breast milk/use caution <Drug information>	
METOCLOPAMIDE	Oral Parenteral	B B	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk / use caution <Drug information>	
METOPROLOL	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
METRONIDAZOLE	Oral Parenteral	B B	- Avoid breast-feeding <WHO> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ขับออกทางน้ำนม และมีผลกระทบต่อเด็ก - AAP แนะนำว่าสามารถให้นมบุตรได้หลังจากบริหารยาไปแล้ว 12-24 ชม.
MIDAZOLAM	Parenteral	D	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enter breast milk/use caution <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานการใช้ยาในกลุ่ม BZP อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
MINOXIDIL	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
MIRTAZAPINE	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Excreted in breast milk / use caution <Drug information>	
MISOPROSTOL	Oral	X	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- มีรายงานว่าทำให้เกิด uterine bleeding ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และเกิดการแท้งลูกได้ โดยเฉพาะการใช้ใน 1 st trimesters
MITOMYCIN-C	Parenteral	D	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	- มีรายงานการศึกษาในสัตว์ว่าทำให้เกิด limb abnormalities, cleft palate, spontaneous abortions, hydronephrosis
MOMETHASONE	Nasal	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
MONOBASIC + DIBASIC SODIUM PHOSPHATE (SWIFF)	Oral	C	- Use caution in nursing woman <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
MONTELUKAST	Oral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
MORPHINE	Oral Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	
MTV	Oral	A	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
NALOXONE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
NAPROXEN	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
NEOSTIGMINE	Parenteral	C	- Avoid breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	- ขับออกทางน้ำนม และมีผลกระทบต่อเด็ก
NEVIRAPINE	Oral	B	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/contraindicated <Drug information>	
NICARDIPINE	Oral Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Avoid use <Medscape>	
NICERGOLINE	Oral	N/A	N/A	- ระมัดระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์
NIFEDIPINE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
NILOTINIB	Oral	D	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
NOREPINEPHRINE	Parenteral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			unknown/use caution <Drug information>	
NORETHISTERONE	Oral	X	- Compatible <AAP> - Enters breast milk / use caution <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานการศึกษาว่าทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (camptomelic syndrome)
NORFLOXACIN	Oral	C	- Compatible <AAP> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
NORTRIPTYLINE	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation>	
NYSTATIN	Oral	C	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
NYSTETIN + GRAMICIDIN + TA	Topical	D	N/A	
OCTREOTIDE	Parenteral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
OFLOXACIN	Oral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
OLANZAPINE	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
OMEPRAZOLE	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
ONDANSETRON	Parenteral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
OSELTAMIVIR	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
OXALIPLATIN	Parenteral	D	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
OXYMETAZOLINE	Nasal	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
OXYTOCIN	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	- ยาทำให้มดลูกบีบตัว อาจทำให้แท้งบุตรได้ - การใช้เพื่อ induce labor จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด hyperbilirubinemia , hyponatremia, convulsion ในทารก
PACLITAXEL	Parenteral	D	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
PANCURONIUM	Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
PANTOPRAZOLE	Parenteral	B	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
PARA AMINOSALICYLIC ACID	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
PARACETAMOL	Oral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO>	
PARECOXIB	Parenteral	N/A	N/A	- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ (3 rd trimesters) และหญิงให้นมบุตร
PENICILLINS	Oral Parenteral	B	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Compatible with breast-feeding <Medscape>	
PERPHENAZINE	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Avoid <Medscape>	
PETHIDINE	Oral	C	- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
PHENOBARBITAL	Oral	D	- Compatible with breast-feeding. Monitor infant for side effects. <WHO> - Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- ยามารุกได้ และมีรายงานการใช้ยาใน 3 rd trimesters อาจเกิดอาการ withdrawal ของทารกแรกคลอด (seizures, hyperirritability)
PHENYLEPHRINE	Ophth	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
PHENYTOIN	Oral Parenteral	D	- Compatible with breast-feeding. Monitor infant for side effects. <WHO> - Compatble <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ยามารุกได้ และทำให้เกิดความพิการของทารกแรกคลอด (มีรายงานทำให้เกิด Fetal hydantoin syndrome 10%- 30% เป็นความผิดปกติในระบบต่างๆ รวมไปถึง CNS dysfunction, craniofacial anomalies, major malformations, and nail/digital hypoplasia defects)
PILOCARPINE	Ophth	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
PIOGLITAZONE	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
PIPERAZINE + TAZOBACTAM	Parenteral	B	- Use caution <Medscape> - Use caution <Manufacturer>	
PODOPHYLLIN	Topical	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
POLYGELENE	Parenteral	N/A	N/A	
POLYMYCIN + NEOMYCIN .+ GRAMICIDIN	Ophth	C	- Use caution <Manufacturer>	
POTASSIUM CHLORIDE	Oral Parenteral	C	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			- Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
POVIDONE IODINE	Topical	D	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
PRALIDOXIME	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
PRAZOSIN	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
PREDNISOLONE	Ophth Oral	C/D	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	- Cat. D ถ้าใช้ใน 1 st trimesters
PREGABALIN	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
PRIMAQUINE	Oral	C	Compatible with breast-feeding <WHO>	
PROCATEROL	Oral	N/A	N/A	- กรณีใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ให้คำนึงถึงประโยชน์และโทษจากการใช้ยา - ควรดื่มนมบุตรในช่วงที่มีการใช้ยา
PROPOFOL	Parenteral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
PROPRANOLOL	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
PROPYLTHIOURACIL	Oral	D	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติของทารกแรกคลอด (fetal goiter, hypothyroidism)
PROTAMINE	Parenteral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
PSEUDOEPHEDRINE	Oral	C	- Compatible <AAP>	
PYRAZINAMIDE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
PYRIDOSTIGMINE	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	
PYRIDOXINE	Oral	A	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk / compatible <Drug information>	
QUETIAPINE	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk / not recommended <Drug information>	
QUININE	Oral Parenteral	C C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
RABIES IMMUNOGLOBULIN	Parenteral	C	- no adverse events reported; may be excreted in breast milk <Medscape>	- ระวังในการใช้ในหญิงให้นมบุตร (MIMS)
RABIES VACCINE	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO>	
RANITIDINE	Oral Parenteral	B	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
REBAMIPIDE	Oral	N/A	N/A	- ระวังในการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร (MIMS)
REPAGLINIDE	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
RIFAMPICIN	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
RISEDRONATE	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
RISPERIDAL	Oral	C	- Potential toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk / not recommended <Drug information>	
RITONAVIR	Oral	B	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
ROCURONIUM	Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
ROSUVASTATIN	Oral	X	- Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	- มีรายงานผลของยากลุ่มสแตตินทำให้เกิดการตายและความพิการของทารกในครรภ์ และทารกแรกคลอด
ROXITHROMYCIN	Oral	N/A	N/A	- ระวังในการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร (MIMS)
SALBUTAMOL	Inhalation Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
SENOKOT	Oral	C	- Compatible <AAP> - Compatible with breast-feeding <Drug information>	
SERTRALINE	Oral	C	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
SEVOFLURANE	Inhalation	B	- Compatible <AAP>	
SILDENAFIL	Oral	B	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
SIMETHICONE	Oral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
SIMVASTATIN	Oral	X	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดการตายและความพิการของทารกในครรภ์ และทารกแรกคลอด
SITAGLIPTIN	Oral	B	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
SODIUM BICARBONATE	Oral Parenteral	C	N/A	
SOD.CHRONDRO. + HYALURONATE	Parenteral	N/A	N/A	
SODIUM FUSIDATE	Oral Topical	N/A	- Enter breast milk/use caution <Drug information>	
SODIUM HYALURONATE	Parenteral Ophth	N/A	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
SODIUM VALPROATE	Oral Parenteral	D/X	- Compatible with breast-feeding. Monitor infant for side effects. <WHO>	- กรณีใช้ในการป้องกันไมเกรน จะเป็น Cat. X ส่วนข้อบ่งใช้อื่นๆ เป็น Cat. D
SPIRONOLACTONE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
STAVUDINE	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	
STREPTOKINASE	Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	- เนื่องจากยามีค่าครึ่งชีวิตที่สั้นมาก ประมาณ 23 นาที โอกาสที่จะผ่านเข้าสู่ น้ำนมจึงมีน้อย
STREPTOMYCIN	Parenteral	D	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	- ยาผ่านรกได้ และมีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติต่อการได้ยิน และอาการหูหนวกของทารก
SUCRALFATE	Oral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
SULPROSTONE	Parenteral	N/A	N/A	
SULTAMICIN	Oral	N/A	N/A	
SUXAMETHONIUM (SUCCINYL)	Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown / use caution <Drug information>	
TAMOXIFEN	Oral	D	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	- มีรายงานว่าทำให้เกิดความผิดปกติในทารก (birth defects, fetal deaths, and vaginal bleeding)
TENOFOVIR	Oral	B	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/contraindicated <Drug information>	
TERBUTALINE	Parenteral	B	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
TETANUS ANTITOXIN	Parenteral	C	N/A	
TETANUS TOXOID	Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation>	
TETRACAINE	Ophth	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
TETRACYCLINE	Oral	D	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
THEOPHYLLINE	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO>	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			- Compatible <AAP> - Enters breast milk/compatible <Drug information>	
THIOPENTAL	Parenteral	C		
THIORIDAZINE	Oral	C	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation>	
TIBOLONE	Oral	N/A	N/A	- Tibolone เป็นฮอร์โมนสำหรับสตรีที่หมดประจำเดือนแล้ว ถ้าต้องการมีบุตรให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
TIGECYCLINE	Parenteral	D	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
TIMOLOL	Ophth	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP>	
TINIDAZOLE	Oral	C	- Enters breast milk/contraindicated <Drug information>	
TIOTROPIUM BROMIDE	Inhalation	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
TOBRAMYCIN	Ophth	B	- Not recommended <Drug information>	
TOLPERISONE	Oral	N/A	N/A	- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ (MIMS)
TOPIRAMATE	Oral	D	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk / use caution <Drug information>	
TRACE ELEMENT	Parenteral	C	N/A	
TRAMADOL	Oral Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
TRANEXAMIC ACID	Parenteral	B	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
TRAZODONE	Oral	C	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/use	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			caution <Drug information>	
TRIAMCINOLONE	Intralesion Topical	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Excreted into breast milk/use caution <Drug information>	
TRIFLUOPERAZINE	Oral	C	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk / not recommended <Drug information>	
TRIHEXYPHENIDYL	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
TRIPOLIDINE + PSEUDO	Oral	N/A	- Compatible <AAP>	
TRIPTORELIN	Parenteral	X	- Excretion in breast milk unknown/contraindicated <Drug information>	- มีรายงานการศึกษาในคนทำให้เกิดความผิดปกติของทารก และ spontaneous abortion
TROSPIMUM CHLORIDE	Oral	C	- Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
UNISON	Enema	N/A	N/A	- สามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้
VALSATAN	Oral	D	- Compatible <AAP> - Excretion in breast milk unknown / not recommended <Drug information>	- D in 2 nd & 3 rd trimesters - ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อ rennin angiotensin system มีผลต่อทารกในครรภ์และทารกแรกคลอด (hypotension, anuria, renal failure, neonatal skull hypoplasia, เสียชีวิต)
VANCOMYCIN	Parenteral	C	- Probably compatible <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
VECURONIUM BROMIDE	Parenteral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Excretion in breast milk unknown/use caution <Drug information>	
VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE	Oral	C	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug	

ชื่อสามัญ	รูปแบบยา	Preg. Cat.	Lactation	หมายเหตุ
			information>	
VERAPAMIL	Oral	C	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	
VINPOCETIN	Oral	N/A	N/A	- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
VITAMIN C	Oral	A/C	- Compatible with breast-feeding <WHO>	- Cat. C if dose > US RDA
VITAMIN E	Oral	A/C	- Compatible <Drug in pregnancy & lactation>	- Cat. C if dose > US RDA
VITAMIN K1	Parenteral	C	- Compatible <AAP> - Enters breast milk/use caution <Drug information>	
WARFARIN	Oral	X	- Compatible with breast-feeding <WHO> - Compatible <AAP> - Does not enter breast milk/use caution <Drug information>	- มีรายงานทำให้เกิดความผิดปกติของทารก (fetal warfarin syndrome, CNS abnormalities deafness, seizure, focal cerebella atrophy, hemorrhagic complication, premature birth, spontaneous abortion, death)
ZIDOVUDINE	Oral	C	- Contraindicated <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/contraindicated <Drug information>	
ZOLEDRONIC ACID	Parenteral	D	- Excretion in breast milk unknown/not recommended <Drug information>	
ZUCLOPENTHIXOL	Parenteral	C	- Potential Toxicity <Drug in pregnancy & lactation> - Enters breast milk/not recommended <Drug information>	